

تعامل مع المضادات الحيوية بحرص عند إجراء العمليات الجراحية

إساءة استعمال المضادات الحيوية تعرض جميع المرضى الخاضعين للجراحة إلى الخطر



حسّن

خطر الإصابة بعدوى في
موضع الجراحة، من خلال
تحسين العلاج الوقائي
بالمضادات الحيوية لمنع
العدوى أثناء الجراحة،
واتباع ممارسات الوقاية من
العدوى ومكافحتها

قلل

جودة رعاية المرضى
وسلامتهم، وقلل من
مقاومة مضادات
الميكروبات من خلال الحدّ
من الإصابة بعدوى في
موضع الجراحة



43% من المرضى الذين حصلوا على علاج
وقائي بالمضادات الحيوية لمنع العدوى أثناء
الجراحة، استمروا على هذا العلاج بعد العملية
الجراحية بطريقة غير مناسبة



ما يصل إلى 15% من النساء حول
العالم تُصنّ بعدوى بعد الولادة القيصرية




ما يصل إلى 33% من المرضى الخاضعين للجراحة
يصابون بعدوى تالية للجراحة، 51% من حالات
العدوى هذه تكون مقاومة للمضادات الحيوية


الأشخاص الواجب عليهم ضمان الاستعمال السليم للمضادات الحيوية أثناء الجراحة



يجب أن يكون تحسين
استعمال المضادات
الحيوية في مرافق
العمليات الجراحية جزءًا
من برنامج إدارة
مضادات الميكروبات



تستند هذه التوصيات
إلى بيانات مستقاة من
دراسات أجريت على
مرضى بالغين، ولكنها تعد
صالحة أيضًا للتطبيق
على المرضى الأطفال



لتحقيق علاج وقائي فعّال بالمضادات الحيوية
لمنع العدوى أثناء الجراحة، يجب توفير
تركيزات كافية من المضادات الحيوية في
الأنسجة أثناء إجراء الشق الجراحي وعلى
مدار العملية الجراحية. لذلك، يجب
استعمال مضادات حيوية ذات عمر نصفي
قصير قُبيل إجراء الشق الجراحي

ما ينبغي للعاملين الصحيين القيام به للوقاية من مقاومة
مضادات الميكروبات عند إجراء العمليات الجراحية؟

أعطِ العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية لمنع العدوى
أثناء الجراحة بالحقن الوريدي
- عندما يكون العلاج موصى به، حسب نوع العملية الجراحية
- خلال 120 دقيقة قبل إجراء الشق الجراحي



ما ينبغي تجنبه؟



تجنب إعطاء علاج
بالمضادات الحيوية، ما لم
توجد عدوى في موضع
الجراحة أو عدوى أخرى
مؤكدة أو مشتبه فيها



تجنب مواصلة العلاج
الوقائي بالمضادات
الحيوية بسبب إجراء
عملية نزح
(قيّم كل حالة)



تجنب إرواء الجروح
بالمضادات الحيوية



تجنب الإطالة في العلاج
الوقائي بالمضادات
الحيوية بعد إجراء
العملية الجراحية

