

Comment puis-je soutenir mon enfant?



Assurez-vous que lorsque vous parlez à l'enfant, vous

-  lui faites face
-  Vous trouvez dans un endroit bien éclairé pour que l'enfant puisse voir vos lèvres et votre expression
-  maintenez le bruit de fond bas ou vous déplacez vers un endroit calme
-  parlez clairement et lentement
-  ne criez pas!


Prenez soin de la prothèse auditive ou de l'implant cochléaire de l'enfant, notamment en



-  changeant régulièrement la pile
-  conservant l'appareil dans un boîtier sec pendant la nuit

Suivez les instructions données par le médecin ou l'audiologiste

Suivez une thérapie ou des contrôles réguliers, selon les instructions.



WHO/UCN/NCD/SDR/20.2

© Organisation mondiale de la Santé 2020. Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).

Ne cachez pas la perte auditive de votre enfant



-  Informez les enseignants de l'enfant de sa perte auditive et demandez-leur de faire asseoir l'enfant au premier rang de la classe. Demandez aux enseignants de faire face à l'enfant tout en parlant.
-  Sensibilisez vos amis et les membres de votre famille aux besoins de l'enfant et guidez-les pour qu'ils puissent communiquer efficacement.
-  Faites participer votre enfant à toutes les activités familiales et sociales.

Apprenez à votre enfant à communiquer sur ses besoins sans hésitation

Par exemple, si la prothèse auditive cesse de fonctionner ou pour demander aux gens de se répéter s'ils ne les entendent bien.



-  Apprenez le langage des signes pour mieux communiquer avec votre enfant, si nécessaire.
-  Plaidez en faveur d'un service de l'ouïe auprès des autorités locales, s'il n'en existe pas dans votre région.
-  Contactez une organisation de personnes malentendantes/sourdes ou leurs parents dans votre région et demandez-leur conseil.


N'OUBLIEZ PAS

Une personne sur vingt souffre de perte auditive. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Ne cachez pas la perte auditive de votre enfant!

Organisation mondiale de la Santé whf@who.int

Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant:
<https://www.who.int/health-topics/hearing-loss>

NE LAISSEZ PAS LA PERTE AUDITIVE LIMITER VOTRE ENFANT



Entendre pour toujours



Organisation mondiale de la Santé



Mon enfant pourrait-il avoir une perte auditive?

Votre enfant pourrait avoir une perte auditive s'il / elle:

- Ne réagit pas aux sons.
- Présente un retard ou un mauvais développement de la parole ou du langage pour son âge.
- Ne peut comprendre ce que vous dites ou demande souvent aux gens de se répéter.
- Répond de façon incorrecte aux questions ou instructions.
- Augmente le volume du téléviseur ou a du mal à entendre ce qui se dit au téléphone.
- A de mauvais résultats à l'école ou a des problèmes du comportement.
- A souvent un écoulement de l'oreille ou un bouchon de cire.
- A des épisodes répétés de douleur ou de blocage dans l'oreille.
- A récemment souffert d'une maladie grave comme la méningite.

N'oubliez pas

Chez les bébés, vous devez suspecter une perte auditive si le bébé ne réagit pas aux sons, en particulier à la voix de sa mère, ou s'il n'est pas effrayé par des sons forts, par exemple, un violent bruit.



Je pense que mon enfant pourrait avoir une perte auditive que devrais-je faire?

Faites examiner les oreilles et l'audition de votre enfant dans le centre de soins de santé ou la clinique la plus proche. Généralement, les médecins ORL et les audiologistes peuvent vérifier les oreilles et l'audition. Si vous ne savez pas où aller, demandez conseil à un travailleur de la santé local ou à un médecin.

Comment peut-on vérifier l'audition chez un enfant et est-ce une pratique sécuritaire?

L'audition peut être testée à tout âge. Les nouveau-nés peuvent être testés dans les quelques jours suivant la naissance. L'audition des enfants de jusqu'à cinq ans peut être testée en utilisant:



- otoémissions acoustiques (OAE)
- test des réponses auditives du tronc cérébral (ABR)
- audiométrie par observation comportementale (BOA)

Chez les enfants de plus de cinq ans, l'audition peut être testée par un test d'audiométrie à tonalité pure.

N'oubliez pas

L'examen d'acuité auditive est sûr, indolore et facile!

Quand faire examiner mon enfant?


Le plus tôt possible!

Les nourrissons dont la perte auditive a été diagnostiquée trois mois après la naissance et dont la rééducation a commencé à l'âge de six mois peuvent développer la parole et le langage comme ayant une audition normale.

Même si votre enfant est plus âgé, tout retard affectera sa parole et son apprentissage.

N'oubliez pas

Un diagnostic et une intervention PRÉCOCES sont la clé du succès chez les enfants présentant un problème de perte auditive.



Que faire si mon enfant a une perte auditive? Comment va-t-il/elle communiquer, étudier ou se faire des amis?

Il existe des solutions pour que la perte auditive ne limite pas la vie de votre enfant.

- Les médicaments ou la chirurgie, lorsque la perte auditive est due à une infection de l'oreille ou à l'otite muqueuse à tympan.
- Les prothèses auditives et les implants cochléaires peuvent aider l'enfant à entendre, à développer la parole et le langage et à progresser dans son éducation.
- La rééducation et la thérapie, qui sont très importantes, même lorsque des appareils auditifs ont été installés.
- L'apprentissage du langage des signes, pour que l'enfant puisse communiquer.



Une fois la perte auditive identifiée, le meilleur plan d'action doit être mis en place par la famille conjointement avec le spécialiste ORL/l'audiologiste. L'intervention doit commencer SANS DÉLAI. Vous trouverez de plus amples informations sur ces interventions dans la ressource de base de l'OMS sur les soins auditifs.

N'oubliez pas

Grâce à une intervention appropriée et opportune, il n'y a pas de limite à ce que votre enfant peut accomplir.