

Как я могу помочь своему ребенку?

Выполняйте следующие
правила при разговоре с
ребенком:

-  смотрите ему в лицо
-  разговаривайте в хорошо освещённом месте, чтобы ребёнок мог видеть ваши губы и выражение лица
-  фоновый шум должен быть низким – или перейдите в более тихое место
-  говорите четко и медленно
-  не кричите!

Обслуживайте слуховой
аппарат или кохлеарный
имплант вашего ребенка,
в том числе:

-  регулярно меняйте батарейки
-  ночью храните устройство в сухой коробке

Следуйте
рекомендациям
вашего врача или
аудиолога

Регулярно проходите
лечение или обследования
в соответствии с
рекомендациями.

Не скрывайте проблемы
со слухом у вашего
ребенка

 Сообщите учителям ребенка о проблеме потери слуха и попросите их усадить ребенка за первым столом в классе. Попросите учителей смотреть ребенку в лицо во время разговора.

 Расскажите друзьям и членам семьи о потребностях ребенка и объясните им правила эффективного общения.

 Вовлекайте ребенка во все семейные и общественные мероприятия.

Научите ребенка не
стесняться сообщать о
своих потребностях

Например, если слуховой аппарат перестал работать или если ребенок что-то не расслышал – можно попросить людей повторить сказанное.

 Изучите язык жестов, чтобы лучше общаться с вашим ребенком, если это необходимо.

 Обращайтесь к местным органам власти с требованием создания служб для людей с проблемами слуха, если такие службы отсутствуют в вашем районе.

 Свяжитесь с организациями, оказывающими помощь слабослышащим/глухим людям или их родителям, работающими в вашем районе, и спросите у них совета.


ПОМНИТЕ

Каждый 20-й человек страдает потерей слуха. Нечего стыдиться. Не скрывайте проблемы со слухом у вашего ребенка!

Всемирная организация здравоохранения whf@who.int

Дополнительная информация: <https://www.who.int/health-topics/hearing-loss>

Потеря слуха не должна ограничивать
возможности вашего ребенка



Слышать всегда



Всемирная организация
здравоохранения




Может у моего ребенка быть потеря слуха?

Ваш ребенок, возможно, страдает потерей слуха, если он или она

- Не реагирует на звуки.
- У него/нее наблюдается задержка или нарушение речевого/языкового развития, не соответствующие возрастным нормам.
- Не понимает, что вы ему говорите или часто просит повторить сказанное.
- Неправильно реагирует на вопросы или поручения.
- Прибавляет громкость при просмотре телевизора или плохо слышит, что ему говорят по телефону.
- Плохо учится в школе или имеет проблемы с поведением.
- У него/нее часто наблюдаются выделения из ушей или образуются серные пробки.
- Часто жалуется на боль или заложенность в ухе.
- Недавно перенес серьезное заболевание, например, менингит.

ПОМНИТЕ

Следует подозревать потерю слуха у новорожденного ребенка, если он не реагирует на звуки, особенно на голос матери, или если его не пугают громкие звуки, напр., громкий хлопок.



Я подозреваю потерю слуха у моего ребенка
Что делать?



Проверьте слух и уши Вашего ребенка в ближайшем медицинском центре или клинике. Проверкой ушей и слуха обычно занимаются ЛОР-врачи и аудиологи. Если вы не знаете, куда обратиться, посоветуйтесь с местным медицинским работником или врачом.

Как можно проверить слух ребенка и безопасно ли это?

Слух можно проверить в любом возрасте. Новорожденных младенцев можно обследовать через несколько дней после рождения. Слух у детей в возрасте до пяти лет проверяют следующими способами:



- регистрация отоакустической эмиссии (ОАЭ-тест)
- проверка стволомозговых слуховых вызванных потенциалов (КСВП)
- поведенческая аудиометрия (ВОА)

У детей в возрасте старше пяти лет слух можно проверить с помощью процедуры тональной аудиометрии.

ПОМНИТЕ

Проверка слуха – безопасная, безболезненная и простая процедура!

Когда нужно обследовать ребенка?

Чем раньше, тем лучше!

У младенцев, у которых потеря слуха диагностирована через три месяца после рождения, а реабилитация начата через шесть месяцев, возможно развитие речи и языка, такое же, как у детей с нормальным слухом.

Даже если ваш ребенок старше, любая задержка может негативно повлиять на его речевое развитие и способность к обучению.

ПОМНИТЕ


РАННЯЯ диагностика и раннее вмешательство – ключ к успеху в лечении детей с потерей слуха.



Что делать, если у моего ребенка потеря слуха? **Как он будет общаться, учиться или дружить с другими детьми?**

Существуют решения для того, чтобы потеря слуха не ограничивала жизнь вашего ребенка.

- Лекарства или хирургическая операция, если потеря слуха вызвана ушной инфекцией или экссудативным отитом.
- Слуховые аппараты и кохлеарные импланты могут помочь ребенку слышать, развивать речевые и языковые навыки, а также успешно учиться.
- Реабилитационные и лечебные процедуры, которые очень важны даже при использовании слуховых аппаратов.
- Обучение языку жестов, чтобы ребенок мог общаться.



После диагностики потери слуха семья должна принять решение о том, как лучше всего поступить, проконсультировавшись с ЛОР-специалистом/аудиологом. Вмешательство должно быть начато БЕЗ ЗАДЕРЖКИ. Дополнительную информацию об этих вмешательствах можно найти в пособии ВОЗ "Базовая информация о помощи при болезнях уха и слуха" уха и слуха.

ПОМНИТЕ

При надлежащем и своевременном вмешательстве нет предела тому, чего может достичь ваш ребенок.