

如何对子女给予支持?



在与他们说话时、保证

-  面向他们
-  在光线充足之处、让他们看到您的嘴唇和表情
-  降低背景噪音或者转移到一个安静的地方
-  清晰而缓慢地说话
-  不要喊叫!

留心他们的助听器或人工耳蜗

-  定期更换电池
-  晚上把器具置于干燥的盒子里



服从医生或听力学家的指导

遵医嘱进行常规治疗或检查。



不必隐瞒子女的听力损失问题



-  将子女的听力损失问题告知老师、要求老师让孩子坐在教室的前排。请老师在讲话时面向他们。
-  让朋友和家庭成员了解孩子的需要、引导他们有效沟通。
-  让子女参加所有的家庭和社交活动。




教育子女毫不犹豫地讲出他们的需要。例如、在助听器失灵、或者在听不清楚的情况下想让别人重复他们的话语时。

-  如果需要、学习手语以便更好地与子女交流。
-  所在地区如果缺少听力服务、则向当地政府反映情况。
-  联系您所在地区的重听/聋人组织或这些人的父母、从他们那里寻求指导。

切记

每20个人中、即有一人患有听力损失。听力损失没什么好羞愧的、无须隐瞒。

不让听力损失影响您的子女的生活



保持听力、终生受益



我的子女是否患有听力损失？

您的子女如果出现下列情况、可能是由于听力损失

- 对声响无反应。
- 就其年龄而言、言语/语言能力发育迟缓或不适当。
- 听不明白您说的话或经常要求别人重复他们说的话。
- 对问题或指教不能作出正确回应。
- 调高电视音量或听不清电话里的谈话。
- 在学校表现不佳或有行为问题。
- 耳朵经常有分泌物或耳垢。
- 耳朵时有阵痛或堵塞。
- 最近曾患重病、例如脑膜炎。

切记

就婴儿而言、如果婴儿对声音(尤其是母亲的声音)没有反应、或者没有被响亮的声音(如砰的一声)吓到、就应该怀疑是听力损失



觉得子女患有听力损失应该怎么办？



就近去保健中心或诊所检查他们的耳朵和听力。通常可由耳鼻喉科医生和听力专家检查耳朵和听力。如果不清楚该去何处、请咨询当地卫生工作者或医生。

如何检查儿童的听力、是否安全？

听力可以在任何年龄测试。新生儿可以在出生后几天内测试。五岁以下儿童可以通过以下方式检查听力：



- 耳声发射
- 听觉脑干反应测试
- 行为观察测听法

五岁以上儿童、听力可以通过纯音测听试验来测试。

切记

听力试验安全、无痛且便捷

何时来测试子女的听力？

越快越好！

就婴儿而言、其听力损失在出生后三个月即作出诊断、并在六个月大时着手康复治疗、他们的言语和语言能力发育就有可能与听力正常的人相似。

即使子女更大些、也不能拖延、否则会影响他/她的言语和学习。

切记

早日诊断和干预对成功矫正子女的听力损失至关重要。



子女有听力损失该怎么办？他将如何交流、学习或交友？

有一些办法可以防止听力损失影响他们的生活。

- 药物或手术、如果听力损失是由耳部感染或胶耳引起的。
- 助听器和人工耳蜗有助于儿童提高听力、发展语言和言语、取得教育成果。
- 即使安装了听力器具、康复和治疗也非常重要。
- 学习手语、便利他们进行交流。



一旦确定听力损失、最佳治疗方案必须由患者家属与耳鼻喉科专家/听力专家协商决定。应立即着手干预。可以在世卫组织的耳朵和听力保健基本资源中找到关于这些干预措施的更多信息。

切记

经适当和及时干预、子女的前程不会受到影响