

Çocuğuma nasıl destek olabilirim?

Çocukla konuşurken,



Onunla yüzyüze olun.



İyi aydınlatılmış bir yerde bulunun, böylece çocuk dudaklarınızı ve ifadenizi görebilir.



Arka plan gürültüsünü düşük tutun veya sessiz bir yere geçin.



Anlaşılır ve yavaş konuşun.



Bağırmayın!

Aşağıdakiler dahil olmak üzere çocuğun işitme cihazına veya koklear implantına dikkat edin

Pili düzenli olarak değiştirin.

Cihazı geceleri kuru bir kutuda tutun.

Odyolog veya doktor tarafından verilen talimatları izleyin

Talimatlara uygun olarak düzenli tedavi veya kontroller yapın,

Çocuğunuzun işitme kaybını gizlemeyin



Çocuğun öğretmenlerini işitme kaybı hakkında bilgilendirin ve çocuğun sınıfta önlerde oturmasını isteyin. Öğretmenlerden çocukla konuşurken yüzyüze olmasını isteyin.



Arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi çocuğun ihtiyaçları hakkında bilgilendirin ve etkin iletişim kurlarına rehberlik edin.



Çocuğunuzun tüm aile aktivitelerine ve sosyal aktivitelere katılımını sağlayın.

Çocuğunuza ihtiyaçları hakkında tereddüt etmeden iletişim kurmasını öğretin.

Örneğin, işitme cihazının çalışmadığı veya insanları duymada zorluk çektiği durumlarda, konuşmacılardan tekrar etmelerini çekinmeden istemeleri için cesaretlendirin.



Gerekirse çocuğunuzla daha iyi iletişim kurmak için işaret dilini öğrenin.



Bölgenizde işitme hizmetleri bulunmuyorsa, yerel yetkililerle iletişime geçin.



Bölgenizde bulunan işitme güçlüğü çeken / işitme engelli kişiler veya ebeveynleri ile temasa geçin ve rehberlik isteyin.


UNUTMAYIN

Her 20 kişiden birinde işitme kaybı vardır. Utanacak bir şey yok. Çocuğunuzun işitme kaybını saklamayın!

World Health Organization whf@who.int

For more details refer to: <https://www.who.int/health-topics/hearing-loss>

İŞİTME KAYBININ ÇOCUĞUNUZU SINIRLAMASINA İZİN VERMEYİN



Yaşam için işitme



Çocuğumda işitme kaybı olabilir mi?

Çocuğunuzun işitme kaybı varsa:

- Seslere cevap vermez.
- Yaşına göre gecikmiş veya zayıf konuşma ve dil gelişimi gösterir.
- Ne dediğinizi anlamaz ya da sık sık insanlardan söylediklerini tekrar etmelerini ister.
- Sorulara veya talimatlara yanlış yanıt verir.
- Televizyonun sesini açar veya telefonda söylenenleri duymakta güçlük çeker.
- Okulda kötü performans gösterir veya davranış sorunları vardır.
- Genellikle kulak akıntısı veya kulak kiri vardır.
- Kulakta tekrarlanan ağrı atakları veya tıkanma vardır.
- Son zamanlarda menenjit gibi ciddi bir hastalık geçirmiş olabilir.

UNUTMAYIN

Bebekler söz konusu olduğunda, bebek seslere, özellikle de annenin sesine yanıt vermiyor veya yüksek şiddette gürültülerden ürkmüyorsa, işitme kaybından şüphelenmelisiniz.



Çocuğumda işitme kaybı olabilir ne yapmalıyım?



Çocuğunuzun kulaklarını ve işitme duyusunu en yakın sağlık merkezi veya kliniğinde kontrol ettirin. Odyologlar ve KBB doktorları çocuğunuzun kulaklarını ve işitmesini kontrol eder. Nereye gideceğinizden emin değilseniz, yerel bir sağlık çalışanından veya doktordan yardım isteyin.

Çocukta işitme nasıl kontrol edilebilir ve güvenli midir?

İşitme her yaşta test edilebilir. Yeni doğan bebekler doğumdan birkaç gün sonra test edilebilir. Beş yaşına kadar olan çocukların işitme duyusu aşağıdakiler kullanılarak kontrol ettirilebilir:



- otoakustik emisyon (OAE)
- İşitsel beyin sapı yanıt testi (ABR)
- davranışsal gözlem odyometrisi (BOA)

Beş yaşından büyük çocuklarda işitme, saf ses odyometri testi ile test edilebilir.

UNUTMAYIN

İşitme testi güvenli, acısız ve kolaydır!

Çocuğumu ne zaman test ettirmeliyim?

En kısa sürede!

Doğumdan üç ay sonra işitme kaybı teşhisi konan ve altı ayıktan başlayarak rehabilitasyon alan bebeklerde normal işitenlere benzer konuşma ve dil geliştirmek mümkündür.

Tanınız gecikmiş olsa bile erken müdahale, erken işitme cihazı kullanımı ve erken rehabilitasyon dil ve konuşma gelişimi için oldukça önemlidir.

UNUTMAYIN

ERKEN tanı ve müdahale, işitme kaybı olan çocuklarda başarının anahtarıdır.



Çocuğumda işitme kaybı varsa ne olur?

Nasıl iletişim kuracak, eğitim görecektir veya arkadaş edinecek?

İşitme kaybının çocuğunuzun yaşamını sınırlamaması için çözümler vardır.

- İşitme kaybının kulak enfeksiyonu veya kulak akıntısından kaynaklandığı durumlarda ilaç veya cerrahi müdahale.
- İşitme cihazı ve koklear implant çocuğun işitme, konuşma ve dil gelişimine ; eğitiminde ilerlemesine yardımcı olabilir.
- İşitme cihazıyla birlikte çok önemli olan rehabilitasyon ve terapi.
- Çocuk işaret dili öğrenerek iletişim kurabilir.



İşitme kaybı tespit edildikten sonra, Odyolog ve KBB doktoruna danışarak en iyi çözüm yoluna aile tarafından karar verilmelidir. Müdahale GECİKMEDEN BAŞLATILMALIDIR. Bu müdahaleler hakkında daha fazla bilgiyi Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel Kulak ve İşitme Tedavisi Kaynağında bulabilirsiniz.

UNUTMAYIN

Doğru ve zamanında müdahale ile, çocuğunuzun başarabileceklerine dair bir sınır yoktur.